

## Памятка населению о вирусной геморрагической болезни кроликов (ВГБК)

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) является вирусным заболеванием, которое проявляется в виде геморрагического диатеза во всех органах, особенно в легких и печени. Причинами распространения болезни кроликов могут быть: - ввоз в благополучные хозяйства инфицированных животных, находящихся в инкубационном периоде, стадии реконвалесценто́в или вирусоносительства; - контакт здоровых кроликов с инфицированными на выставках, ярмарках, рынках, при транспортировке, случке и обмене; - использование без дезинфекции транспорта для перевозки живых кроликов, сырья или кормов; - мясо и шкуры больных кроликов и вирусоносителей; - концентрированные корма (при получении их в заготовконторах в обмен на шкурки); - растительные корма (трава, сено), где могли находиться больные кролики или трупы этих животных (например: на рынке один кроликовод продал кроликов, сосед попросил у него остатки зелени с прилавка, где сидели только что проданные кролики, скормил эту зелень своим кроликам, которые затем пали от ВГБК). - пищевые отходы, собранные у населения и с предприятий общественного питания; - предприятие по переработке шкурок кроликов, пушно-меховые базы, холодильники, убойные пункты, где не обеззараживают отходы производства и сточные воды – предприятия по переработке мяса кроликов, производству мясокостной муки, производства кормов из пищевых отходов (вторичного сырья); - ветеринарные диагностические учреждения при не соблюдении мер предосторожности при проведении экспертиз или недостаточном обеззараживании патологического материала. До 2-х месячного возраста кролики слабо восприимчивы к болезням. Но с возрастом эта вероятность заболевания увеличивается. Сукрольные и лактирующие самки больше всего подвержены заболеванию, особенно в осенне-зимний период. Распространяется вирус воздушным путем и долгое время не разрушается в окружающей среде. При болезни падеж поголовья достигает до 90%. Болезнь развивается от 1-3 суток, при этом почти не проявляется. Обычно внешне здоровые кролики делают несколько судорожных движений конечностями и погибают. У отдельных особей наблюдается легкое угнетение, отсутствие аппетита и за 1-2 часа до гибели истечение из носа (желтые или кровянистые). При острой форме заболевания наблюдаются затрудненное дыхание с повышением температуры, спазмы и кровотечение из носа, рта и анального отверстия. Симптомы могут иметь разные отличия в зависимости от состояния животного. Эффективного лечения в данное время не разработано. Летальность 90-100%. Единственным средством предотвратить эпизоотию это провести вакцинацию. В первый раз крольчат прививают в возрасте 45 дней, затем через 3 месяца, потом через 6 месяцев на протяжении всей жизни. Павших животных сжигают, закапывание в землю и сброс в мусорные баки категорически запрещается в связи с высокой устойчивостью вируса, что может привести к дальнейшему распространению вируса.

Обо всех случаях заболевания животных, их внезапного падежа незамедлительно оповещать специалистов ветеринарной службы, контактный телефон (839156)27-5-96, 27-5-08